

**acec**

## TAZOBIR

PIPERACILINA - TAZOBACTAM  
4 g - 0,5 g  
POLVO PARA SOLUCIÓN  
INYECTABLE I.V.

### Composición:

Cada vial contiene:  
Piperacilina sódica USP equivalente a  
Piperacilina.....4,0 g  
Tazobactam sódico USP equivalente a  
Tazobactam..... 0,5 g

### Indicaciones y posología:

Tratamiento de las infecciones moderadas a severas producidas por gérmenes sensibles a la Piperacilina / Tazobactam.

### Posología:

- Niños mayores de 2 meses: 80 - 100 mg/ 12,5 mg, dosis vía intravenosa cada 8 horas.
- Adultos: 4g/500 mg dosis, vía intravenosa

1

sa cada 8 horas.

**Advertencias:** Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el período de lactancia, a menos que el médico lo indique. No exceda la dosis prescrita.

### MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Se ha observado hipersensibilidad cruzada con el uso de este medicamento y otros betalactámicos y/o cefalosporinas.

**Precauciones:** Durante su uso debe realizarse control hematológico, del funcionamiento hepático y/o renal. Ajustar la dosis en ancianos.

### Reacciones Adversas:

- **Gastrointestinales:** Diarrea, náusea, vómito, constipación, anorexia, gastritis, candidiasis intestinal, colitis psedo-membranosa.
- **Hematológicas:** Anemia, leucopenia,

2

neutropenia, agranulocitosis, púrpura trombocitopénica, incremento en la concentración sérica de la bilirrubina, transaminasas y fosfatasa alcalina.

- **Neurológicas:** Cefalea, insomnio y trastornos audio - vestibulares.
- **Renal:** Nefritis intersticial, aumento del nitrógeno ureico y creatinina sérica.
- **Otras:** Erupciones cutáneas, prurito, reacciones de hipersensibilidad, tromboflebitis, hipoalbuminuria, hipotensión, hipoglicemia, hipopotase-mia.

En el caso de presentar algún evento adverso a medicamento, favor comunicarse con el Departamento de Farmacovigilancia de Acec Soluciones Médicas, C.A.

a través de su página web:  
<https://www.acecsolucionesmedicas.com>

**Interacciones:** Probenecid, aminoglu-cósidos, relajantes musculares, anticoa-gulantes, metotrexate.

Conservar a temperatura inferior a 30 °C.

**CON PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA.  
USO HOSPITALARIO**

3

**Farmacéutico Patrocinante:** Dra. Adriana Auge.

**Fabricado por:** Venus Remedies Limited, India.

**Representado y distribuido por:** Acec soluciones médicas, C.A. República Bolivariana de Venezuela.  
RIF J-502618465

[www.acecsolucionesmedicas.com](http://www.acecsolucionesmedicas.com)

4